




“ ”, 为何?
反 “ ”



可为 、叶、 及 , 以为 和 为主。



“ ”

一、危 :

1、叶 : 叶后 2~3 即可发 , 叶 、叶 叶 两侧出 不 ,
叶 到叶 基 , 叶 下垂, 严 个叶丛 , , 后
可产 ;

2、 : 多从 , 坏 , 及 呈 , 受
下垂



二、发 生：

原 为 害 虫 ， 在 上 一 年 （ 僵 ） 、 叶 和 枝 上 冬 眠 ； 条 件 适 宜 （ 温 度 20 ℃ 左 右 、 土 壤 湿 度 30% 以 上 ） ， 产 大 量 卵 ， 幼 虫 出 现 后 ， 侵 为 害 枝 干 ， 在 叶 和 枝 上 为 害 6-7 天 ， 上 述 为 害 为 9-10 天 ；

幼 虫 叶 低 多 ， 发 叶 晚 ； 成 虫 叶 低 多 ， 产 卵 多 ， 则 受 害 严 重 ； 不 仅 以 及 枝 干 ， 势 强 ， 体 积 大 ； 外 部 ，

地 园 、 土 壤 湿 度 不 以 及 园 也 发 生 。

了 区 域 、 乡 镇 在 4-10 月 右 ， 后 一 半 5-10 月 ， 且 内 部 中 在 18℃-23℃ ， 加 之 多 量 ， 为 传 播 及 侵 害 供 了 利 件 ， 发 生 。

三、 防 治 ：

1、加 培 植 料 ： 增 加 中 元 充 分 ， 增 强 势 力 ； 合 理 修 剪 ， 使 冠 内 光 照 充 足 ， 后 及 时 修 剪 。

2、及 时 出 园 ： 出 园 后 ， 上 述 僵 木 、 叶 和 枝 干 ， 出 园 外 中 心 埋 藏 ， 从 减 少 冬 季 侵 害 ； 发 生 初 期 ， 及 时 剪 除 病 枝 、 叶 。

3、剂 量 防 治 ： 可 在 发 生 前 使 用 国 光 200-300 倍 + 基 肥 （ 50% 基 肥 ） 600-800 倍 出 园 ， 使 国 光 利 （ 50% 利 ） 1000-1500 倍 （ 发 生 严 重 园 ） + 利 （ 80% 代 理 ） 800 倍 ， 后 7 天 右 使 用 国 光 健 1500 倍 + 利 800 倍 。

因 区域、品 种、 候 件、 件及 培 各 不同， 发
况也会 不同，以上 和 仅供参 考，各 园 况

。